

破傷風類毒素疫苗

用途

BIO-TT[®] 為一種破傷風類毒素(Tetanus Toxoid)疫苗，類毒素被吸附到3 mg/ml的磷酸鋁上，並含有硫柳汞0.1 mg/ml被用來作為防腐劑。每劑0.5毫升的類毒素效價至少為40 IU(國際單位)。

BIO-TT[®] 符合WHO對生物製劑和印度尼西亞藥典的要求。

適應症

用於主動免疫以產生抗破傷風的抗體，並透過對育齡婦女進行免疫來預防新生兒的破傷風。

藥物形式

注射用懸液劑

組成

每劑(0.5毫升)包含：

純化的破傷風類毒素	10	Lf
磷酸鋁(作為吸附劑)	1.5	毫克
硫柳汞(作為防腐劑)	0.05	毫克

用法

疫苗在使用前，應予以搖勻以使懸浮液均質化，並應以肌肉注射方式投予。每次注射應使用無菌針頭和無菌注射器。

劑量

BIO-TT[®] 用以預防破傷風/新生兒破傷風需施打三次接種，每次劑量0.5mL肌肉注射，第一次與第二次至少間隔4週，而第三次接種需於第二次接種6個月後進行。

為維持生育期間育齡婦女對破傷風之免疫力，建議接種5劑。

第四次接種須至少於第三次接種後1年施打，第五次接種須至少於第四次接種後1年進行。

BIO-TT[®] 在懷孕期間給藥是安全的，施打時間最好於中期妊娠之後。對於以前未接種過疫苗的婦女，建議在懷孕期間接種兩劑，並至少間隔4週，第二劑應至少在分娩前兩週接種，以預防孕婦和新生兒破傷風。

BIO-TT[®] 當存在可能引發破傷風的風險因子情況下(如:受傷)，仍建議接種本產品。於事發一個月內至少接種兩劑以提供以前未接種過此疫苗的人基本保護力，當超過保護期限時須接種追加免疫一劑。國際接種時程表可提供更多詳細資訊。

BIO-TT[®] 可與卡介苗(BCG)、麻疹、風疹、腮腺炎、脊髓灰質炎(OPV或IPV)、B型肝炎、B型流感嗜血桿菌(Haemophilus influenzae)、黃熱病疫苗和維生素A補充劑同時接種。

副作用

少見而輕微，注射部位可能會產生暫時性的觸痛和發紅。於懷孕期間給藥是安全的。

接種禁忌

- 對破傷風類毒素產生嚴重反應。
- 對破傷風或疫苗內其他成份過敏。
- 高燒或急性感染期間(破傷風除外)。可用於有輕微發熱疾病的患者，例如上呼吸道輕度感染。

用於免疫不全患者

感染人類免疫缺乏病毒(HIV)之患者，不論有無症狀都應按照標準時間表進行BIO-TT[®] 疫苗接種免疫。

藥物相互作用

無。

儲存方式

請在2-8°C之間進行儲存和運輸。切勿冷凍。

包裝含量

每支疫苗安瓶包含0.5毫升(單劑量)。每盒10支安瓶。

Reg. No. DKL0202905843A1

製造廠

PT Bio Farma (Persero)

廠址: Jl. Pasteur No. 28 Bandung 40161 Indonesia

藥商

安特羅生物科技股份有限公司

地址: 10683台北市大安區敦化南路二段76號18F-2

電話: 02-27001216 傳真: 02-27063121

本藥須由醫師處方使用

仿單內容更新日期 2018/01/11